

[Аптека восточных препаратов «Тибетский монах», Костанай – Рудный](#) предлагает ознакомиться с Инструкцией по применению таблеток Сяо Кэ Вань (болюсов XiaoKe Pills) для лечения сахарного диабета 2-го типа

ИНСТРУКЦИЯ О ПРЕПАРАТЕ ХАОКЕ PILLS

Пожалуйста, прочитайте инструкции по применению в розничной торговле или по указанию врача.

Продукт содержит глибенкламид.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Radix Puerariae, Radix Rehmanniae, Radix Astragali, Radix Trichosanthis, Stylus Zeae Maydis, Fructus Schisandrae Sphenantherae, Rhizoma Dioscoreae и Glibenclamide.

ОПИСАНИЕ:

Концентрированные таблетки черного цвета; сладкий, кислый и слегка терпкий на вкус.

ДЕЙСТВИЯ И ПОКАЗАНИЯ:

Тонизирует почки, питает Инь, восполняет Ци и родовую жидкость, показанные для истощения жажды (диабета) из-за двойного дефицита Ци и Инь, проявляющегося как полидипсия, полиурия и полифагия, истощение, усталость, недостаток силы, плохой сон, люмбаго и диабет типа II с вышеупомянутыми симптомами.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

На 10 таблеток весом 2,5 г содержит глибенкламид 2,5 мг.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

Для орального применения перед едой. 5-10 таблеток дважды или трижды в день или по медицинскому назначению.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ:

Литература показала основные побочные реакции:

(1) гипогликемию из-за задержки приема пищи, тяжелой физической активности, превышения дозы лекарственного средства и комбинации с некоторыми лекарственными средствами, приводящими к возникновению гипогликемии. В случае возникновения гипогликемии, диета или сахар давались для облегчения гипогликемии. Тяжелая гипогликемия также возникала в пожилом возрасте, при слабости и превышении дозы лекарственного средства или в случаях с гепаторенальной недостаточностью.

(2) извержение лекарственного средства происходило иногда.

(3) иногда возникали легкая тошнота и рвота.

(4) алопеция возникала редко.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Противопоказан беременным и кормящим грудью женщинам.
2. Противопоказан при диабете I типа; диабете II типа, сопровождающимся кетоацидозом, комой; инфекция, тяжелая травма и серьезная операция.
3. Противопоказан при заболеваниях печени и почек, аллергии на сульфонамиды и лейкопении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Продукт содержит глибенкламид. Используется строго по рецептуре и контролирует уровень глюкозы в крови.

Продукт является составным препаратом китайских травяных лекарств в сочетании с западной медициной. Ввиду нехватки клинических данных трудно доказать, что этот препарат соединения может уменьшить или устранить побочную реакцию глибенкламида.

Следующие пункты перечисляют соответствующую информацию для врачей и пациентов.

1. Начальная доза составляет 5 таблеток и постепенно увеличивается в соответствии с состоянием болезни. Максимальная однократная доза составляет 10 таблеток и 30 таблеток в день. В случае удовлетворительного лечебного эффекта уменьшите дозу или поддерживайте 2 раза в день до завтрака и обеда. Контролируемая доза должна быть направлена врачом.

2. Плохая толерантность к гипогликемии в возрасте старше 65 лет, обратите внимание, чтобы избежать возникновения гипогликемической реакции. Уровень сахара в крови натощак следует контролировать в <7,8 ммоль / л (140 мг / дл) и ммоль / л (200 мг / дл) через 2 часа после еды.

3. Продукт не может вводить вместе препараты против серной кислоты.

4. Препарат в сочетании со следующими лекарственными средствами может привести к возникновению гипогликемии:

1) пробенецид, аллопуринол (для лечения подагры).

2) алкоголь (замедляет метаболизм лекарств от сульфогомочевины), циметидин, ранитидин (H₂-гесер - блокирующий агент) хлорамфеникол; миконазол (противогрибковый агент); антикоагулянт. Препараты с сульфамией, используемые вместе с алкоголем, могут привести к болям в животе, тошноте, рвоте, головной боли, покраснению лица, особенно в сочетании с хлорпропамидом; при использовании вместе с кумаринами (антикоагулянт) концентрация в плазме увеличивалась как на начальной стадии, так и снижалась позднее.

3) продукт может способствовать выделению сульфуринных препаратов из комбинации с плазменным альбумином, таким как салицилат, клофибраты.

4) Спирт, салицилаты, измелин, ингибитор моноаминоксидазы и хинидин сами обладают гипогликемическим действием.

5) Инсулин, метформин, акарбоза и повышенная чувствительность к инсулину в сочетании с продуктом могут привести к гипогликемии.

6) блокирующий рецептор р-надпочечников может препятствовать увеличению крови сахара во время гипогликемии и блокируют гликолиз гликогена в печени и одновременно покрывают симптомы гипогликемии.

5. Продукт в сочетании со следующими лекарствами может увеличить возникновение гипергликемии.

(1) глюкокортикоид, эстрин, тиазид (диуретик), фенитоин натрия, лифампин.

(2) Агент, блокирующий 0-надпочечниковый рецептор, может противодействовать секреции инсулина лекарственными препаратами сульфореа и приводит к гипергликемии.

6. В период приема лекарств необходимо периодически проверять уровень сахара в крови, глюкозы в моче, кетона в моче, белка мочи, функции печени и почек, гемограммы и офтальмологические исследований.

7. Тщательно используется для случаев с ослабленной лихорадкой, высокой температурой, тошнотой, рвотой, недостаточностью надпочечников или гиподисфункцией передней доли гипофиза.

8. При возникновении гипогликемии следует применять следующие меры:

(1) пероральное применение глюкозы, сладкого фруктового сока или воды с сахаром немедленно в легких случаях, инъекция глюкозы применяется в тяжелых случаях, и наблюдение за пациентом восстанавливается после потери сознания.

(2) глюкагон вводили подкожной, внутримышечной или внутривенной инъекцией, в случае повторного появления гипогликемии, глюкозы или диеты после инъекции, чтобы гарантировать пациенту опасность.

Фармакокинетика:

Тест фармакокинетики показал, что концентрация глибенкламида в крови повышалась через 30 минут после введения и через 2-3 часа достигала наивысшего уровня.

УПАКОВКА:

Пластиковая бутылка, 30 грамм (120 таблеток) в одной бутылке, одна бутылка в одной коробке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ:

36 месяцев

СТАНДАРТ РЕАЛИЗАЦИИ:

ЧП 2015, книга первая

СЕРТИФИКАТ №:Го Яо Чжун Цзы Z44020045

АДРЕС: 32 Yun Pu Yi Road, промышленная зона Yun Pu, район Хуан Пу, Гуанчжоу, КНР

КОНСУЛЬТАЦИЯ КАЧЕСТВА ТЕЛЕФОН / ФАКС: (020) 32067487 ОПТОВЫЙ ТЕЛЕФОН: (020)

32218888

Примечание. Данная инструкция на английском языке прилагается к таблеткам Сяо Кэ Вань (болюсы Xiaoke Pills) для лечения сахарного диабета 2-го типа, описанным на следующей странице аптеки «Тибетский монах», Костанай – Рудный: <http://kitayskaya-apteka-kostanay.asia.kz/letschebnie-preparati-tabletki/tabletki-ot-diabeta.html>